

荨麻疹分几种,分别有什么临床表现?

作者: arthinking

原文链接: <https://ld246.com/article/1440752987034>

来源网站: 链滴

许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<p>根据病程，荨麻疹一般分为急性和慢性两类。

 ① 急性荨麻疹：起病急，剧痒。随后出现大小不等、形态各异的鲜红色风团。风团可为圆形、椭圆、孤立、散在或融合成片。风团大时，可呈苍白，表面毛孔显著似桔皮样。风团此伏彼起，病重者可有心慌、烦躁、恶心、呕吐、甚至血压降低等过敏性休克样症状部分患者可出现腹痛、腹泻、甚至窒息。

 ② 慢性荨麻疹 风团时多时少，此起彼伏，反复发生病程持续4周以上。

 此外，荨麻疹还有一些特殊类型。

 ① 血管性水肿：可单独发生，但更多的是伴随急性荨麻疹。损害常发生于组织疏松的部位，如眼睑、口唇、外生殖器等处，为突然发生的限局性肿胀，色正常或淡、表面光亮，自觉发紧发胀，不痛不痒。若发生于喉头粘膜，可引起呼吸困难，甚至窒息死亡。

 ② 皮肤划痕症：亦称人工荨麻疹。用手掐抓或用钝器划过皮后，沿划痕发生条状隆起，伴有搔痒，不久消退。可单独发生或与荨麻疹伴发。

 ③ 寒冷性荨麻疹：分两种，一种为家族性，除皮损外，同时有发热、发冷、头痛、关节痛等症状，发作时嗜中性白细胞增多。另一种为获得性，重者除有风团肿外，还出现手麻、唇麻、心悸、气紧、腹痛、腹泻或晕厥。有时进冷食可引起口腔或喉头水肿。

 ④ 胆碱性荨麻疹：即小丘疹状荨麻疹，自觉剧痒。有时仅有痒而无皮疹。偶伴发乙酰胆碱的全身反应，如流涎、头痛、脉缓、瞳孔缩小等。

 ⑤ 日光性荨麻疹：发生于暴露日光下的部位，严重者有全身反应如畏寒、乏力、晕厥、痉挛性腹痛等。

 ⑥ 压迫性荨麻疹：皮肤受压后约4-6小时，局部发生肿胀，持续8-12小时消退。常见于行后的足底部和臀部受压迫后的部位。为慢性、复发性、真皮深层及皮下组织的大片局部性水肿。病因发病机制与荨麻疹相同，只是血浆是从真皮深部或皮下组织的小血管内皮细胞间隙中渗出而进入到周围疏松组织内而引起。</p>